

診療科	疾患	治療方針	レジメン名	1クール (日数)	治療回数	薬品名	投与量	投与日	備考
外科・消化器内科	胃癌	術前・術後	D-FLOT	28	4 (術前2クール+ 術後2クール)	イミフィンジ ドセタキセル オキサリプラチン フルオロウラシル	1500mg/body 50mg/m2 85mg/m2 2600mg/m2（24時間投与）	D1 D1、15 D1、15 D1、15	術前2クール+術後2 クール実施し、その 後イミフィンジ維持 療法（最大10回）へ 移行する
外科・消化器内科	胃癌	術後補助	【維持】イミフィンジ	28	10	イミフィンジ	1500mg/body	D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	オブジーボ	14		オブジーボ	100mg/m2	D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	オブジーボ	28		オブジーボ	480mg	D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	エンハーツ	21		エンハーツ	6.4mg/kg	D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	XP	21		カベシタビン シスプラチン	2000mg/m2/D 80mg/m2	D1～D14 D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	XELOX	21		カベシタビン オキサリプラチン	1000mg/m2/回 130mg/m2	D1～14 1日2回 D1	
外科・消化器内科	胃癌	術後補助	XELOX	21	6	カベシタビン オキサリプラチン	1000mg/m2/回 130mg/m2	D1～14 1日2回 D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	weekly nab-PTX	28		アブラキサン	100mg/m2	D1、D8、D15	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	TXT C法	28		ドセタキセル	25mg/m2	D1、8、15	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	TXT B法	21		ドセタキセル	60mg/m2	D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	SOX	21		TS1 オキサリプラチン	80～120mg/D 130mg/m 2	D1～14 1日2回 D 1	
外科・消化器内科	胃癌	術後補助	S1+TXT D法	21	6	TS1 ドセタキセル	80mg/m2/日 40mg/m2	D1～14 1日2回 D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	S1+TXT A法	21		TS1 ドセタキセル	80mg/m2/日 40mg/m2	D1～14 D1	
外科・消化器内科	胃癌	術後補助	S1+TXT	21		TS1 ドセタキセル	80mg/m2/日 40mg/m2	D1～14 1日2回 D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	S1+PTX A法	21		TS1 パクリタキセル	80mg/m2/日 50mg/m2	D1～14 1日2回 D1、8	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	S1+CPT-11 B法	28		TS1 イリノテカン	80mg/m2/日 100mg/m2	D1～14 1日2回 D1、8	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	S1+CPT-11 A法	21		TS1 イリノテカン	80mg/m2/日 150mg/m2	D1～14 1日2回 D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	S1+CDDP	35		TS1 シスプラチン	80mg/m2/日 60mg/m2	D1～21 1日2回 D8	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	RAM+ロンサーフ	28		サイラムザ ロンサーフ	8mg/kg 35mg/m2/回(1日2回)	D1、15 D1～5、8～12	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	RAM+PTX	28		サイラムザ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/m2	D1、15 D1、8、15	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	RAM+nab-PTX	28		ラムシルマブ アブラキサン	8mg/kg 100mg/m2	D1、15 D1、8、15	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	RAM	14		サイラムザ	8mg/kg	D1	

外科・消化器内科	胃癌	進行再発	PTX B法	28		パクリタキセル	80mg/m2	D1、8、15	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	オブジーボ+XELOX	21		オブジーボ オキサリプラチン カペシタビン	360mg/body 130mg/m2 1000mg/m2/回(1日2回)	D1 D1 D1～14	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	オブジーボ+SOX	21		オブジーボ オキサリプラチン TS-1	360mg/body 130mg/m2 40mg/m2/回(1日2回)	D1 D1 D1～14	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	オブジーボ+FOLFOX	14		オブジーボ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	360mg/body 85mg/m2 400mg/m2 400mg/m2 1200mg/m2	D1 D1 D1 D1 D1から46時間持続	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	アブラキサン	21		アブラキサン	260mg/m2	D1	
外科・消化器内科	胃癌	補助	mFOLFOX6	14		オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	D1 D1 D1から46時間持続	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	LTN	42		レンチナン	2mg/body	D1、8、15、22	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	HER + XELOX	21		トラスツマブ カペシタビン オキサリプラチン	初回は8mg/kg (2回目以降6mg/kg) 1000mg/m2/回 130mg/m2	D1 D1～14 1日2回 D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	HER + TXT (S1併用)	21		トラスツマブ ドセタキセル TS1	初回は8mg/kg (2回目以降6mg/kg) 40mg/m2 80mg/m2/日	D1 D1 D1～14 1日2回	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	HER + SOX	21		TS1 オキサリプラチン トラスツマブ	BSA<1.25m2 80mg/D 1.25～1.5 m2 100mg/D > 1.5 m2 120mg/D 130mg/m2 初回は8mg/kg (2回目以降6mg/kg)	D1～14 D1 D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	HER + CDDP + Xeloda	21		トラスツマブ シスプラチン カペシタビン	初回は8mg/kg (2回目以降6mg/kg) 80mg/m2 1000mg/m2/回	D1 D1 D1～14 1日2回	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	CPT-11 + CDDP B法	28		イリノテカン シスプラチン	70mg/m2 80mg/m2	D1、15 D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	CPT-11 + CDDP A法	14		イリノテカン シスプラチン	60mg/m2 30mg/m2	D1 D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	CPT-11 C法	14		イリノテカン	150mg/m2	D1	

外科・消化器内科	胃癌	進行再発	ピロイ+mFOLFOX6	14	12	ピロイ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	初回は800mg/m2 (2回目以降：400mg/m2) 85mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	D1 D1 D1 D1から46時間持続	最大12クールとし、 その後はピロイ+5-FU/LVへ移行。
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	ピロイ+CAPOX	21	8	ピロイ オキサリプラチン カペシタビン	初回は800mg/m2 (2回目以降：600mg/m2) 130mg/m2 1000mg/m2	D1 D1 D1～14	最大8クールとし、 その後はピロイ+カペシタビンへ移行。
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	【維持】ピロイ+5FU/LV	14		ピロイ フルオロウラシル フルオロウラシル	400mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	D1 D1 D1から46時間持続	ピロイ+mFOLFOX6 後に使用する
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	【維持】ピロイ+カペシタビン	21		ピロイ カペシタビン	600mg/m2 1000mg/m2	D1 D1～14	ピロイ+CAPOX後に 使用する
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	キイトルーダ+CAPOX	21	6	キイトルーダ オキサリプラチン カペシタビン	200mg/body 130mg/m2 1000mg/m2/回(1日2回)	D1 D1 D1～14	最大6クールとし、 その後はキイトルーダ+カペシタビンへ移行。
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	キイトルーダ+SOX	21		キイトルーダ オキサリプラチン TS-1	200mg/body 130mg/m2 40mg/m2/回(1日2回)	D1 D1 D1～14	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	【維持】キイトルーダ+カペシタビン	21		キイトルーダ カペシタビン	200mg/body 1000mg/m2/回(1日2回)	D1 D1～14	キイトルーダ +CAPOX後に使用する
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	キイトルーダ+FP	21	6	キイトルーダ シスプラチン フルオロウラシル	200mg/body 80mg/m2 800mg/m2	D1 D1 D1～5	最大6クールとし、 その後はキイトルーダ+5-FUへ移行。
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	【維持】キイトルーダ+6FU	21		キイトルーダ フルオロウラシル	200mg/body 800mg/m2	D1 D1～5	キイトルーダ+FP後に使用する
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	RAM+IRI	14		ラムシルマブ イリノテカン	8mg/kg 150mg/m2	D1 D1	2nd line以降に使用
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	HER+mFOLFOX6	42		トラスツズマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	初回は8mg/kg (2回目以降6mg/kg) 85mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	D1、22 D1、15、29 D1、15、29 D1、15、29から46時間持続	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	キイトルーダ+HER+XELOX	21	6～8	キイトルーダ トラスツズマブ カペシタビン オキサリプラチン	200mg/body 初回は8mg/kg (2回目以降6mg/kg) 1000mg/m2/回 130mg/m2	D1 D1 D1～14 1日2回 D1	

外科・消化器内科	胃癌	進行再発	キイトルーダ+HER+SOX	21	6～8	キイトルーダ TS1 オキサリプラチン トラスツズマブ	200mg/body BSA<1.25m2 80mg/D 1.25～1.5 m2 100mg/D >1.5 m2 120mg/D 130mg/m2 初回は8mg/kg（2回目以降6mg/kg）	D1 D1～14 1日2回 D1 D1	
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	【維持】キイトルーダ+HER+カペシタビン	21		キイトルーダ トラスツズマブ カペシタビン	200mg/body 初回は8mg/kg（2回目以降6mg/kg） 1000mg/m2/回	D1 D1 D1～14 1日2回	キイトルーダは最大 35回まで PD-L1陽性（CPS≧1）
外科・消化器内科	胃癌	進行再発	【維持】キイトルーダ+HER+TS-1	21		キイトルーダ TS1 トラスツズマブ	200mg/body BSA<1.25m2 80mg/D 1.25～1.5 m2 100mg/D >1.5 m2 120mg/D 初回は8mg/kg（2回目以降6mg/kg）	D1 D1～14 1日2回 D1	キイトルーダは最大 35回まで PD-L1陽性（CPS≧1）