

消化器内視鏡検査における抗血栓薬等の休薬について(春日井市民病院) 第5版

	一般名	代表的な商品名	内視鏡検査等			肝生検・RFA
			休薬日数 (出血低危険度) ^{※1} 単剤の場合	休薬日数 (出血低危険度) ^{※1} 多剤服用の場合	休薬日数 (出血高危険度) ^{※2}	休薬日数 (抗血栓薬は手術条件)
			※手術当日を0日とする			
抗凝固薬	アピキサバン	エリキュース	なし	1日	1日	2日
	エドキサバン	リクシアナ	なし	当日のみ	当日のみ	1日
	ダビガトラン	ブラザキサ	なし	1日	1日	eGFR \geq 50 2日 50>eGFR \geq 30 4日
	リバーロキサバン	イグザレルト	なし	当日のみ	当日のみ	1日
	ワルファリン	ワーファリン	なし	2-3日	2-3日	5日
抗血小板薬	アスピリン・アスピリンPPI配合剤	バイアスピリン/バファリンA81 /タケルダ/キャピリン/	なし	なし	2日	7日
	アスピリン/クロピドグレル	コンブラピン	なし	4日	4日	7日
	イコサペント酸エチル	エパデール	なし	1日	1日	7日
	イフェンプロジル酒石酸塩	セロクラール	なし	1日	1日	1日
	イブジラスト	ケタス	なし	1日	1日	3日
	オザグレルナトリウム	オザグレル	なし	1日	1日	2日
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ	なし	1日	1日	7日
	クロピドグレル	ブラビックス	なし	4日	4日	14日
	サルボグレラート	アンブラーグ	なし	1日	1日	2日
	シロスタゾール	プレタール	なし	1日	1日	4日
	セレキシバグ	ウブトラビ	なし	1日	1日	1日
	チカグレロル	ブリリント	なし	4日	4日	5日
	チクロピジン	パナルジン	なし	4日	4日	10日
	トリメタジジン	バスタレルF	なし	1日	1日	2日
	ニセルゴリン	サアミオン	なし	1日	1日	1日
	プラスグレル	エフィエント	なし	6日	6日	14日
	ベラプロスト	ドルナー/プロサイリン/ベラサスLA/ ケアロードLA	なし	1日	1日	1日
	血管拡張薬	ジビリダモール	ベルサンチン/ベルサンチンL	なし	1日	1日
ジラゼブ		コメリアン	なし	1日	1日	3日
トラビジル		ロコルナール	なし	1日	1日	4日
リマプロスタアルファデクス		オバルモン/プロレナール	なし	1日	1日	1日
血糖降下薬	ビグアナイド薬	メトホルミン/メトグルコ/グリコラン/配合剤/ジベトス/ジベトン	上部消化管) 当日のみ 大腸内視鏡) 1日			当日のみ
	SGLT2阻害薬	スーグラ/フォシーガ/ルセフィ/アブルウエイ/デベルザ/ カナグル/ ジャディアンス/配合剤	上部消化管) 当日のみ 大腸内視鏡) 1日			
	それ以外	その他の経口血糖降下薬/注射製剤	上部消化管) 当日のみ 大腸内視鏡) 1日			
漢方薬		ツムラ人参栄養湯などすべての漢方薬	当日のみ	当日のみ	当日のみ	7日
サプリメント		ω 3系脂肪酸やニンニク抽出エキスなど	当日のみ	当日のみ	当日のみ	7日